



## Productos Fitosanitarios

# Laudis®

Herbicida / Suspensión concentrada

### DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:**

TEMBOTRIONE

**Composición porcentual:**

Ingredientes activos:	% en peso
<b>Tembotrione:</b> 2-{2-cloro-4-metil-3-[(2,2,2-trifluoroetoxi)metil]benzoil} Ciclohexano-1,3-diona.....	34.5
(Equivalente a 415 g de i.a./L a 20°C)	
<b>Ingredientes inertes:</b> Protector de cultivo, antiespumante, dispersante, humectante, Espesante, anticongelante y disolvente.....	65.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>

**Categoría toxicológica:**

4 Precaución

**No. de Registro:**

RSCO-HEDE-0202F-301-064-035

**Sistemicidad:**

Sistémico	Contacto	Translaminar
X		

**Descripción:**

Herbicida post-emergente selectivo. Controla gramíneas y algunas hojas anchas. Rápida penetración (2 horas).

### USOS

CULTIVO	MALEZA		Observaciones	Dosis (mL/ha)	I. de S. (días)
	Nombre común	Nombre científico			
MAIZ	Zacate cola de zorra Zacate triguillo Zacate pata de ganso	<i>Setaria grisebachii</i> <i>Brachiaria plantaginea</i> <i>Eleusine multiflora</i>	<b>Aplicación en postemergencia al cultivo y a la maleza.</b>  Cuando la maleza tenga de 5 a 15 cm de altura y el cultivo hasta 40 cm.	300	90 para grano  47 para forraje
	Achualillo Chayotillo Quelite	<i>Simsia amplexicaulis</i> <i>Sicyos deppei</i> <i>Amaranthus hybridus</i>			
	Zacate Johnson Zacate pinto Zacaton Zacate triguillo	<i>Sorghum halepense</i> <i>Brachiaria platyphylla</i> <i>Panicums decolorans</i> <i>Urochloa fasciculata</i>			
	Zacate brillante Zacate navajita	<i>Brachiaria plantaginea</i> <i>Chloris chloridea</i>			

**Laudis®**

Página 1 de 2

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science no se hace responsable del uso y resultado de los productos.

## Productos Fitosanitarios

	Zacate pata de gallo Zacate escobilla	<i>Digitaria ciliaris</i> <i>Leptochloa mucronata</i>			
MAÍZ	Zacate de agua Verdolaga	<i>Echinochloa colonum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	<b>Realizar la aplicación cuando las malezas tengan una altura menor de 10 cm</b>	300	45
MAÍZ	Zacate peludo Tripa de gallina	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> <i>Commelina diffusa</i>	<b>Se debe de mezclar con Maister a 75 g de producto formulado por ha. Aplicar cuando la maleza tenga una altura menor de 10 cm.</b>	300	75 para grano 45 para forraje

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.

### RESTRICCIONES DE ROTACIÓN

Cultivo	Meses entre aplicación y siembra del cultivo
Brócoli	45 días
Calabacita	45 días
Cebada	45 días
Chile	45 días
Frijol	45 días
Sorgo	45 días
Tomate	45 días
Tomatillo	45 días
Trigo	45 días

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

300 mL + 1 L de Dyne-Amic®