



Infinito®

Fungicida / Suspensión concentrada

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
FLUOPICOLIDE + PROPAMOCARB CLORHIDRATO

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	% en peso
Fluopicolide: 2,6-Dicloro-N-[[[3-cloro-5-(trifluoro-metil)-2-pyridinil]methyl]benzamida	5.55 (Equivalente a 62.5 g de I.A./L a 20°C)
Propamocarb clorhidrato: Propil 3-(dimetilamino)propilcarbamato-hidrocloruro	55.55 (Equivalente a 625 g de I.A./L a 20°C)
Ingredientes inertes: espesante, emulsificante, dispersante, Antiespumante, disolvente, impurezas y compuestos relacionados	39.90
TOTAL	100.00

Categoría toxicológica:
Precaución (VI)

No. de Registro:
RSCO-MEZC-1301S-301-064-061 VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN

Sistemicidad:

Sistémico	Contacto	Translaminar
X		X

Descripción:

Innovador fungicida sistémico para aspersión foliar con un rápido efecto inicial que protege de forma prolongada contra el ataque del Tizón tardío y Mildiú vellosa en los cultivos de solanáceas y cucurbitáceas.

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (2)	Mildiú de las cucurbitáceas	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.25-1.75	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días, realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Chile Jitomate Tomate de cáscara Berenjena Papa (5)	Tizón Tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.0	Realizar cuatro aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.
() I. de S. : días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L